

Coronavirus (COVID-19)

17 février 2021

Recommandations de santé publique Consignes à suivre pour la **personne qui présente des symptômes de la COVID-19**

Si vous présentez des symptômes tels que la fièvre, l'apparition ou l'aggravation d'une toux, une difficulté à respirer ou une perte subite de l'odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût, il est possible que vous ayez la COVID-19, même si vous n'avez pas subi de test de détection. D'autres symptômes peuvent aussi apparaître, comme un mal de gorge, un mal de tête, de la douleur musculaire, une fatigue intense, une perte importante de l'appétit, des vomissements ou de la diarrhée. Nous vous demandons de suivre les consignes suivantes pour éviter de transmettre la COVID-19 aux autres personnes.

D'autres fiches sont disponibles. Assurez-vous de consulter la fiche appropriée à votre situation :

- [Consignes à suivre pour la personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19](#)
- [Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact étroit d'un cas confirmé de COVID-19](#)
- [Consignes à suivre pour la personne en attente d'un test ou d'un résultat de test pour la COVID-19](#)
- [Consignes à suivre pour la personne de retour d'un pays étranger](#)

Restez à la maison



- N'allez pas à l'école, au travail, au CPE, à la garderie ni dans aucun endroit public (ex. : magasin).
- Ne sortez pas prendre une marche.
- N'empruntez pas les transports publics.
- Si vous n'avez pas d'aide pour votre épicerie ou vos médicaments, vous pouvez utiliser les services de livraison à domicile de l'épicerie ou de la pharmacie et évitez le contact à moins de 2 mètres avec le livreur.
- N'accueillez pas de visiteurs à la maison.
- Si vous habitez avec d'autres personnes qui n'ont pas de symptômes et qui n'ont jamais eu la COVID-19:
 - Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent possible.
 - Évitez d'être en contact avec les autres personnes de la maison. Si c'est impossible, gardez une distance d'au moins 2 mètres entre vous et les autres. Couvrez votre nez et votre bouche (voir encadré plus bas) si vous devez vous approcher à moins de 2 mètres.
 - Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de la maison.

- Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est réservée. Sinon, désinfectez-la après chaque utilisation.
- Recommandez aux personnes qui habitent avec vous de surveiller l'apparition de symptômes au cours des 2 prochaines semaines. Si des symptômes surviennent, elles devront appliquer les consignes de cette fiche.
- Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant une fenêtre (si la météo le permet).

Vous pouvez sortir à l'extérieur sur votre balcon ou dans votre cour privée, en vous assurant d'être à 2 mètres de toute autre personne.

Couvrez votre nez et votre bouche



- Si possible, utilisez un masque ou un couvre-visage pour vous couvrir le nez et la bouche :
 - quand une personne est dans la même pièce de la maison que vous, à moins de 2 mètres;
 - si vous devez quitter la maison pour des raisons médicales.
- Pour savoir comment fabriquer et utiliser un couvre visage, consultez la page [Port du masque ou couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie de COVID 19.](#)

Couvrez votre toux et vos éternuements



- Utilisez un mouchoir en papier pour tousser, vous moucher ou éternuer.
- Jetez le mouchoir en papier dans une poubelle dès que possible et lavez-vous les mains.
- Si vous n'avez pas de mouchoir en papier, tousser ou éternuez dans le creux de votre coude.

Lavez vos mains souvent



- Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes.
- Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon; frottez vos mains jusqu'à ce qu'elles soient sèches.
- Lavez aussi vos mains avant de manger, après être allé à la toilette et chaque fois qu'elles sont visiblement sales.
- Fermez le couvercle de la toilette avant de peser sur la chasse d'eau et lavez vos mains.

Ne partagez pas vos objets personnels

- Ne partagez pas vos assiettes, ustensiles, verres, serviettes, draps et vêtements avec d'autres personnes.

Évitez les contacts avec les animaux

Rien n'indique que les animaux jouent un rôle significatif dans la propagation de la COVID-19. Cependant, quelques cas de transmission entre les humains et les animaux ont été identifiés. De plus, les animaux exposés au virus sont comparables à des surfaces qui peuvent être contaminées.

- Comme pour les personnes autour de vous, respectez les mesures d'hygiène à l'égard des animaux.
- Si possible, demandez à un autre membre de votre foyer de prendre soin de vos animaux. Sinon, lavez-vous les mains avant et après les soins donnés à un animal. Couvrez votre toux et vos éternuements.
- Si possible, gardez vos animaux à l'intérieur. À l'extérieur, utilisez une laisse ou un espace clôturé privé.

- Informez toute personne qui prend soin de vos animaux de limiter les contacts avec ceux-ci, de se laver les mains avant et après ces contacts, puis d'appliquer les mesures habituelles de prévention des [maladies animales transmissibles à l'humain](#) sur www.mapaq.gouv.qc.ca/zoonoses.
- Pour obtenir plus d'information, consultez les [questions et réponses concernant les propriétaires ou gardiens d'un animal sur Québec.ca](#).

Surveillez vos symptômes et prenez votre température chaque jour

- Prenez votre température chaque jour, à la même heure, et notez-la.
- Si vous prenez un médicament contre la fièvre, attendez au moins 4 heures avant de prendre votre température.

Cela sera utile si vous avez besoin de consulter un professionnel de la santé.

Comment vous soigner

Notez la date de début du premier symptôme, cela sera utile si vous appelez à la ligne 1 877 644-4545 ou si vous consultez un professionnel de la santé. Cette information aidera à déterminer le moment où l'isolement sera terminé.

Dans la grande majorité des cas, vous pouvez vous soigner à la maison. Consultez le [Guide autosoins](#).

En général, il est recommandé de passer un test en présence de symptômes de la COVID-19. Consultez [l'Outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19](#) pour savoir si vous devez passer un test.

- Si vous devez vous présenter dans une clinique médicale ou un hôpital, portez un masque ou un couvre-visage et informez le personnel dès votre arrivée que vous avez des symptômes de la COVID-19.
- Si vous avez des symptômes graves comme une difficulté à respirer, un essoufflement important ou une douleur à la poitrine, signalez le 911 avant de vous rendre à l'urgence et avisez-les que vous avez des symptômes de la COVID-19.

Si une personne doit vous aider dans vos activités quotidiennes

(ex. : aide pour manger, aller à la toilette, vous déplacer dans la maison, etc.)

Idéalement, c'est toujours la même personne qui devrait vous aider. Cette personne devrait être âgée de moins de 70 ans, être en bonne santé et ne pas avoir de maladie chronique, comme une maladie cardiaque ou respiratoire, une insuffisance rénale, un diabète, une obésité importante (IMC > 40), un système immunitaire affaibli ou être en traitement pour un cancer.

Lorsqu'une autre personne est dans la même pièce que vous et à moins de 2 mètres, vous devez porter un masque ou un couvre-visage pour vous couvrir le nez et la bouche.

Avant de vous aider, la personne doit :

1. Se laver les mains;
2. Porter un masque ou un couvre-visage pour couvrir le nez et la bouche;
3. Porter des gants jetables.

Après vous avoir aidé, la personne doit :

4. Enlever ses gants et les jeter dans une poubelle fermée, hors de la portée des enfants;
5. Se laver les mains;
6. Enlever son masque ou son couvre-visage
 - a. Placer le couvre-visage dans un sac fermé, hors de la portée des enfants, jusqu'à ce qu'il soit lavé normalement;
 - b. S'il s'agit d'un masque jetable, le mettre dans une poubelle fermée.
7. Se laver les mains encore une fois.

Précautions à prendre par la personne qui fait le lavage et le nettoyage à la maison

Les draps, serviettes et vêtements de la personne malade, de même que les couvre-visages utilisés pour couvrir le nez et la bouche, peuvent être lavés avec ceux des autres personnes de la maison. Toutefois, s'ils sont très souillés, par exemple par des vomissements, les laver séparément.

- Lavez à l'eau chaude.
- Portez des gants jetables (évitiez le contact direct des vêtements, draps et serviettes de la personne malade avec votre peau et vos vêtements).
- Ne secouez pas le linge sale.

Les ustensiles et la vaisselle utilisés par la personne malade doivent être nettoyés avec votre savon à vaisselle habituel et de l'eau ou au lave-vaisselle.

Les déchets de la personne malade peuvent être jetés avec les vidanges de la maison dans une poubelle avec un sac. Fermez bien le couvercle de la poubelle ou le sac de vidanges.

Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l'eau :

- Après tout contact avec la personne malade ou avec des objets ou des surfaces qu'elle a touchés (ex. : table de chevet, vaisselle, etc.).
- Avant et après la préparation de la nourriture, avant de manger, après être allé à la toilette et chaque fois qu'elles sont visiblement sales.
- Si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon, utilisez un désinfectant à base d'alcool.

Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour :

- Les surfaces et objets fréquemment touchés par la personne malade (ex. : poignées, table de chevet, cadre de lit et autres meubles de sa chambre).
- La salle de bain et la toilette.

Si la surface est propre, appliquez le désinfectant.

Sinon, nettoyez avec de l'eau et du savon pour éliminer les saletés. Rincez à l'eau claire puis essuyez avec une serviette propre avant d'appliquer le désinfectant.

Laissez la solution désinfectante agir quelques minutes (selon les directives du fabricant) avant d'essuyer toute trace de produit à l'aide d'un linge propre.

Pour le nettoyage :

- Portez des gants imperméables lors du nettoyage.
- Lavez vos mains et vos avant-bras avant de mettre vos gants et après les avoir retirés.
- Lavez les gants avec de l'eau et du détergent puis séchez-les ou remplacez-les par une nouvelle paire au besoin.
- Lavez vos mains à nouveau.

Produits pour le nettoyage et la désinfection

Pour nettoyer, utilisez de l'eau et du savon ou des produits de nettoyage à usage domestique. Pour désinfecter, utilisez votre désinfectant habituel ou préparez un mélange contenant 1 partie d'eau de Javel domestique et 9 parties d'eau froide (ex. : 1 tasse d'eau de Javel et 9 tasses d'eau).

Dans la mesure du possible, les endroits réservés à la personne malade devraient être nettoyés et désinfectés par cette dernière.

Vous pouvez contacter le service Info-Social 811 (consultation téléphonique psychosociale 24/7) si vous vivez :

- du stress, de l'anxiété;
- des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents, irritabilité, etc.);

- un sentiment de panique;
- des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête : cela vous envahit et vous fait peur;
- des répercussions sociales de la maladie.

Des professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de l'information et des conseils, selon vos besoins.

COVID-19 et isolement à la maison

Qu'est-ce que la COVID-19?

La COVID-19 est une maladie causée par le nouveau coronavirus.

Quels sont les symptômes?

Les principaux symptômes sont la fièvre, l'apparition ou l'aggravation d'une toux et une difficulté à respirer ou une perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale. D'autres symptômes peuvent aussi apparaître : mal de gorge, mal de tête, douleur musculaire, fatigue intense, perte importante de l'appétit, vomissements et diarrhée.

Comment se transmet la COVID-19?

Elle se transmet d'une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l'air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. Une personne qui n'a pas de symptômes peut transmettre la COVID-19 sans le savoir. La transmission par des surfaces ou des objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de transmission principal.

Pourquoi est-il important de respecter les recommandations d'isolement à la maison?

Pour éviter de transmettre la maladie à d'autres personnes.

Quand peut-on arrêter l'isolement à la maison?

Si vous avez été identifié comme un contact d'un cas de COVID-19 ou que vous êtes de retour d'un voyage à l'étranger, consultez les consignes appropriées (voir les liens au début de ce document).

Attention :

Les recommandations qui suivent doivent être appliquées à moins d'une recommandation différente de la santé publique.

Si vous êtes un travailleur de la santé, communiquez avec votre milieu de travail pour recevoir les consignes pour la levée de l'isolement ou le retour au travail.

Situations	Quand arrêter l'isolement	
<p data-bbox="82 1461 375 1696">Vous avez passé un test pour la COVID-19</p> <p data-bbox="82 1717 375 1940">Consultez la fiche Consignes pour la personne en attente de résultat de test</p> <p data-bbox="82 1717 375 1940">(Dans l'attente de votre résultat de test, toutes les personnes qui vivent avec vous doivent aussi s'isoler.)</p>	<p data-bbox="407 1528 524 1591">Résultat positif</p>	<p data-bbox="557 1430 1484 1486">Vous pouvez arrêter l'isolement dès que 10 jours se sont écoulés depuis le début de vos symptômes et :</p> <ul data-bbox="557 1507 1537 1650" style="list-style-type: none"> - que vous n'avez plus de fièvre depuis au moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre la fièvre); et - que vos symptômes se sont améliorés depuis au moins 24 heures (excluant la toux et la perte de l'odorat, qui peuvent durer plus longtemps). <p data-bbox="557 1671 1414 1696">Consultez la fiche Consignes pour la personne atteinte de COVID-19.</p>
	<p data-bbox="407 1812 524 1875">Résultat négatif</p>	<p data-bbox="557 1728 797 1753">Si vous n'êtes pas :</p> <ul data-bbox="557 1774 1117 1881" style="list-style-type: none"> - un contact d'un cas confirmé de COVID-19, - en attente pour un 2^e test de COVID-19, - un voyageur de retour au Canada depuis moins de 14 jours, <p data-bbox="557 1902 1495 1959">vous pouvez reprendre vos activités habituelles si votre état de santé le permet.</p>

Vous n'avez pas passé de test pour la COVID-19	<p>Vous avez l'un des symptômes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fièvre (38,1°C et plus); – Apparition ou aggravation d'une toux; – Difficulté à respirer; – Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale; – Mal de gorge; – Rhinorrhée ou congestion nasale (de cause inconnue). 	<p>Vous pouvez arrêter l'isolement dès que 10 jours se sont écoulés depuis le début de vos symptômes et :</p> <ul style="list-style-type: none"> - que vous n'avez plus de fièvre depuis au moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre la fièvre); et - que vos symptômes se sont améliorés depuis au moins 24 heures (excluant la toux et la perte de l'odorat, qui peuvent durer plus longtemps). <p>Consultez l'Outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19 ou contactez la ligne 1 877 644-4545 pour obtenir un test.</p> <p>Les personnes qui vivent sous le même toit doivent aussi s'isoler au moins 14 jours.</p>
	<p>Vous avez un seul symptôme autre que ceux nommés plus haut (ex. : mal de tête, fatigue intense, diarrhée).</p>	<p>Vous pouvez arrêter l'isolement.</p>
	<p>Vous avez deux symptômes ou plus autres que ceux nommés plus haut (ex. : mal de tête, fatigue intense, diarrhée).</p>	<p>Consultez l'Outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19 ou contactez la ligne 1 877 644-4545 pour savoir si un test est indiqué et si oui, comment procéder pour l'obtenir.</p> <p>Les personnes qui vivent sous le même toit doivent aussi s'isoler si un test est indiqué pour vous.</p>

Aucun document (exemple attestation) ou démarche ne devrait être requis après une période d'isolement. Une fois la durée de celle-ci terminée, vous pouvez reprendre vos activités, si les autres conditions sont remplies.

En cas de doute, contactez la ligne **1 877 644-4545** ou consultez le [Guide autosoins](#) sur Quebec.ca/coronavirus.